

Якщо ви маєте хоча б один із цих симптомів, негайно зверніться до лікаря акушера-гінеколога



- порушення менструального циклу, а саме
 - затримка понад два тижні, мажучі кров'янисті виділення
 - менструальна кровотеча триває понад сім днів, вона інтенсивніша, ніж зазвичай (прокладки не вистачає на дві години)
 - кровотеча між менструаціями
 - кровотеча після фізичного навантаження або статевого контакту
- раптовий або наростаючий біль в нижній частині живота, нудота, блювання, запаморочення
- періодичні болі внизу живота – тягнучі, колючі, переймоподібні, різучі, відчуття здуття
- підвищення температури на фоні болю внизу живота
- свербіж зовнішніх статевих органів, незвичні виділення з піхви
- утворення на зовнішніх статевих органах (папіломи та інші)
- кровотеча в менопаузі
- наявність ущільнення в молочній залозі, зміна форми грудей, виділення з сосків

а також, якщо

- був незахищений секс з ризиком інфікуватися інфекціями, що передаються статевим шляхом, включно з ВІЛ
- було сексуальне насильство

Адреси медичних закладів у Дніпропетровській і Запорізькій областях



<https://linktr.ee/JSBmed>

! У цих закладах ви отримаєте:

- невідкладну гінекологічну допомогу
- консультацію гінеколога
- призначення обстеження та лікування