

СКРИНІНГ НА РАК ШИЙКИ МАТКИ

Організація скринінгу раку шийки матки

1. Проведіть віковий аналіз жінок, які мають договір про надання ПМД або знаходяться на обстеженні чи лікуванні у лікаря акушера-гінеколога
2. Сформуйте список жінок віком 30-55 років, які підлягають скринінгу, та віком 21-30 років при наявності факторів ризику, в т.ч. ВІЛ/СНІД
3. Організуйте запрошення жінок на консультацію
4. Створіть маршрути пацієнток для подальшого проходження скринінгу в своєму закладі або закладі спеціалізованої допомоги

Методи проведення скринінгу РШМ

- Цитологічне дослідження шийки матки (ПАП-тест) / рідинна цитологія
- ВПЛ-тест

Методика забору матеріалу для ПАП-тесту

- Огляд шийки матки в дзеркалах
- Використання гінекологічних щіточок, які дозволяють зібрати матеріал із зони переходу з ектоцервіксу до ендцервіксу
- Перенесення клітинного матеріалу у віалю із консервуючим розчином або на скло з фіксацією 96% етиловим спиртом або іншим фіксатором
- Транспортування віал або скелець з направленнями до лабораторії



Схема 1
Цервікальна щітка —
5x на 360°





Схема 2
Ендцервікальна щітка (+у парі з цервікальною) — 1x на 90-180°




Схема 3 Комбінована цервікальна щітка — 2x на 360°, не використовується під час вагітності



Стандарт
медичної
допомоги



Порядок скринінгу і
ранньої діагностики

Жінкам віком **з 21 року до 30 років** рекомендована цитологія (ПАП-тест) за показаннями, які визначає лікар.

- ВПЛ-тест у цій віковій групі не рекомендується у зв'язку з високим рівнем поширеності ВПЛ-інфекції серед молодих жінок та здатністю вірусу до елімінації під дією імунної системи.
- Скринінг РШМ здійснюється незалежно від проведення вакцинації проти ВПЛ.

Жінкам, які **старші 25 років з ВІЛ-позитивним статусом**, рекомендовано проведення цитології (ПАП-тесту) щорічно протягом трьох років. Якщо результати трьох послідовних цитологій (ПАП-тесту) є нормальними, повторні обстеження надалі проводяться кожні три роки.

Жінкам **віком 30-55 років** рекомендується проведення цитології (ПАП-тесту) / ВПЛ-тест кожні 10 років.

Скринінг припиняється у жінок **старших 65 років**, у яких не було важкої дисплазії (CIN2-3) останні 25 років і протягом 10-ти річного періоду результат цитології (ПАП-тесту) був негативним.

Результати досліджень мають бути оформлені за стандартизованою класифікацією BETHESDA (Додаток 3 Стандарту медичної допомоги)

Обов'язково потрібно ознайомити жінку з результатом дослідження.

Негативний результат → визначається алгоритм подальшого скринінгу.

Позитивний результат → направлення жінки до фахівців спеціалізованої допомоги (гінекологи, онкогінекологи) згідно з затвердженим маршрутом пацієнта щодо перенаправлення

